



# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.10.2015

№ 963

г. Киров

**Об утверждении региональной медико-экономической модели  
лечения начавшихся преждевременных родов с применением  
Атозибана (1 и 2 этап) для учреждений 1 и 2 уровня с  
транспортировкой в КОГБУЗ «Кировский областной  
клинический перинатальный центр» S044.006**

На основании Положения о министерстве здравоохранения Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 09.06.2015 №42/295 в целях улучшения качества и доступности медицинской помощи:

1. Утвердить Региональную медико-экономическую модель лечения начавшихся преждевременных родов с применением Атозибана (1 и 2 этап) для учреждений 1 и 2 уровня с транспортировкой в КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр S044.006 (далее – Модель). Прилагается.

2. Главным врачам медицинских организаций Кировской области организовать работу в соответствии с Моделью.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника отдела по развитию медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Кировской области Савинову М.В.

Министр

Е.Д. Утемова

**УТВЕРЖДЕНА**  
**распоряжением министерства**  
**здравоохранения**  
**Кировской области**  
**от 08.10.2015 №936**

**Региональная медико-экономическая модель лечения начавшихся преждевременных родов с применением атозибана (1 и 2 этап) для учреждений 1 и 2 уровня с транспортировкой в Перинатальный центр S044.006**

**Категория возрастная:** взрослые

**Пол:** женский

**Фаза:** начавшиеся преждевременные роды

**Стадия:** 1 и 2 этапы.

**Вид медицинской помощи:** скорая медицинская помощь

**Форма оказания:** экстренно

**Средние сроки лечения:** 3-6 часов

**Код МКБ – 10:** O60.0

**Показания:**

- Срок беременности с 27 недель до 33,6 недель
- Регулярные сокращения матки – 4 за 20 минут
- Укорочение шейки матки менее 2,5 см, сглаженная шейка матки, открытие маточного зева от 0 до 3 см
- Удовлетворительное состояние плода
- Возраст старше 18 лет.

**Противопоказания:**

- Срок беременности до 24 недель и более 34 недель
- Преждевременный разрыв плодных оболочек при беременности сроком более 30 недель
- Внутриутробная задержка роста плода
- Признаки дистресса плода
- Маточное кровотечение
- Умеренная и тяжелая преэклампсия
- Внутриутробная гибель плода
- Предлежание плаценты
- Преждевременная отслойка плаценты
- Хориоамнионит
- Острая инфекция любой локализации

**N.B! Перед применением Атозибана необходимо провести комплексную оценку состояния плода и тест на излитие околоплодных вод (амниотест)!!! Выполнение КТГ обязательно!!!**

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
------------------------	---------------------------------	---	---

**1. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением.**

V02.069.003	Комплекс услуг по оказанию медицинской помощи в пути следования при медицинской эвакуации фельдшером	1	1
-------------	--	---	---

A23.30.042	Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением	1	1
------------	--	---	---

## 2. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения.

Код	АТХ классификация	Наименование лекарственного препарата	Усредненный показатель частоты предоставления	Единицы измерения	ССД	СКД
B05XA	Растворы электролитов	Натрия хлорид	1,0	мл	100	400
G02CX	Другие препараты для применения в гинекологии	<b>Атозибан*</b>	1,0	мг	81,75	330
H02AB	Глюкокортикоиды	<b>Дексаметазон</b>	1,0	мг	12	12

\* 1 этап введения атозибана: в течение 1 минуты вводится 1 флакон 0,9 мл препарата без разведения (начальная доза 6,75 мг)

Приготовление раствора для в/в инфузии: из 100 мл флакона 0,9% натрия хлорида удалить 10 мл и вместо них ввести 10 мл (2 флакона по 5 мл) атозибана. В результате во флаконе 100 мл содержится 75 мг атозибана.

2 этап сразу после болюсного введения первой дозы проводится инфузия препарата в дозе 18мг/час со скоростью 24 мл/час (8 кап в мин) в течение трех часов, что составит 72 мл раствора из 100 мл.

Оставшиеся 28 мл раствора продолжать капать со скоростью 8 мл/час (доза атозибана 6мг/час) еще 3 часа. Таким образом двух флаконов атозибана по 5 мл достаточно для проведения токолиза в течение 6 часов.